

C. FORNASINI


LAGENA FELSINEA N. SP.



LAGENA FELSINEA n. sp.

Lagena cfr. *ovum*, Fornasini 1891, Tavola Foram. Ponticello, fig. 8

È di piccole dimensioni (1), allungata, alquanto irregolare, arrotondata alle estremità, cilindrica, leggermente compressa nella regione orale, liscia, lucida, trasparente in modo da lasciar scorgere il tubo nell'interno, variabile nelle



proporzioni, sicchè, dati due esemplari di eguale lunghezza, è diverso in essi il diametro della sezione trasversa. Il tubo è eccentrico, l'apertura è *fissurina*.

Carattere costante e distintivo della *L. felsinea* è la forma alquanto irregolare e leggermente curva verso l'estremità orale. Per tale carattere essa differisce dalla *L. emaciata* Reuss (2) e dalla *L. ovum* Ehrenberg-Brady (3), essendo inoltre ben distinta dalla prima per avere apertura *fissurina* e non raggiata, e dalla seconda per essere molto meno ovale e più allungata. Differisce poi dalle forme gracili della *L. apiculata* Reuss (4), perchè appunto non è *apiculata* alla estremità aborale.

Fossile nell'argilla grigia pliocenica del Ponticello di Sàvena presso Bologna.

(8 dicembre 1894).


(1) Le figure qui unite rappresentano i contorni di due esemplari veduti all'ingrandimento di 160 diametri.

(2) Sitz. Ak. Wiss. Wien, vol. XLVI, p. 319, tav. I, fig. 9.

(3) Report Foram. Chall., tav. LVI, fig. 5.

(4) Ibidem, fig. 4.

Il *Cenchridium dactylus* di Ehrenberg (Mikrog., tav. XXIV, fig. 1 e 2) è una *Lagena* entosolenica, gracile, allungata e regolare, che non sappiamo se sia o no compressa. La *Miliola? pusilla* dello stesso autore (Ibidem, tav. XXVI, fig. 3), il cui contorno somiglia assai a quello della *L. felsinea*, non sappiamo se sia una *Lagena*.



BOLOGNA - TIP. GAMBERINI E PARMEGGIANI
